

浸水した家屋の消毒方法

薬剤の濃度や用法などは、薄めて（希釈して）使用するものがあります。
使用上の注意事項を確認してから使用しましょう。

消毒薬(成分)	消毒対象	調整方法	使用方法
次亜塩素酸ナトリウム (ハイターやブリーチなどの 家庭用塩素系漂白剤(原液 濃度は約5%)でもよい) ！脱色や金属腐食作用があ るので注意すること	食器類 流し台、浴槽	0.02%に希釈する 【原液が5%の場合】ペットボ トルのキャップ1杯(約5mℓ) を水1ℓに希釈する	① 水と洗剤で洗う ② 調整した液に5分間漬けるか、 液を含ませた布で拭き、その後、 水洗い・水拭きする ③ よく乾燥させる
	床、壁 家具類	0.1%に希釈する 【原液が5%の場合】ペットボ トルのキャップ2杯(約10mℓ) を水500mℓに希釈する 【原液が10%の場合】キャッ プ1杯(約5mℓ)を水500m ℓに希釈する	① 汚れを洗い流すか水拭きして から十分乾燥させる ② 調整した液を浸した布でよく 拭く ③ (次亜塩素酸ナトリウムを使用した 場合)金属面や木面は、水で二度 拭きする
消毒用アルコール (アルコール濃度70%以上 のもの) ！火気のあるところでは使 用しないこと	床、壁 家具類	希釈せず原液のまま使用する	① 水と洗剤で洗う ② アルコールを含ませた布で拭く
	食器類 流し台、浴槽		

【消毒薬の希釈例1】

5%の薬剤ならキャップ2杯(約10mℓ)
10%の薬剤ならキャップ1杯(約5mℓ)


500mℓのペットボトル
一杯まで水を加えると
濃度約0.1%



【消毒薬の希釈例2】

5%の薬剤を大さじ2杯(約30mℓ)

10ℓのバケツの七分目
まで水を加えると
濃度約0.02%



参考：日本環境感染学会「一般家屋における洪水・浸水など水害発生時の衛生対策と消毒方法」

清掃・消毒作業が終わったら

- 作業が終わったらしっかり手洗い
- ケガをした場合はしっかり洗浄、消毒
- 深い傷や汚れた傷、目を洗浄しても充血する場合は医師に相談
- 消毒薬の使用後は、よく乾燥させてください