

新型コロナウイルスワクチン接種情報 vol.12

現時点のワクチン接種に関する情報をお知らせします。(令和4年5月10日時点)

若狭町新型コロナウイルスワクチン接種対策室

4回目接種を受けられるようになりました。
4回目接種により、高い重症化予防効果が得られます。

4回目接種の対象について

3回目の接種から**5**か月が経過した

① 60歳以上の方

② 18歳以上60歳未満で、基礎疾患のある方

その他に新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方

基礎疾患の対象者となる方



18歳以上60歳未満の方は、以下の基礎疾患について該当するかどうかご確認ください。

- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病（高血圧を含む）
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病（肝硬変等）
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
- 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
- 染色体異常
- 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を持っている（※1）、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を持っている（※1）場合）
 - ※1 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持している方については、通院又は入院していない場合も、基礎疾患のある方に該当します。
- BMIが30以上である
 - BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) BMI30の目安：身長160cmで体重約77kg
- 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた

接種時期

7月以降

接種会場

リブラ若狭会場・歴史文化館会場・医療機関

接種費用

無 料

ワクチンの種類

ファイザー社製ワクチン、モデルナ社製ワクチン

接種券の発送について

- 3回目接種から5か月を経過する60歳以上の方には、6月以降に、順次発送いたします。
- 18歳以上60歳未満の方で、基礎疾患のある方で、接種を希望される方は、若狭町新型コロナワクチン接種コールセンターへお電話ください。

若狭町コールセンター電話番号：0770-62-9060

新型コロナワクチンの効果

海外の研究では、3回目接種から4か月以上経過した60歳以上の方にファイザー社製ワクチンを4回接種した場合、オミクロン株流行期において、接種後6週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたと報告されています。

新型コロナワクチンの安全性

海外の研究では、4回目接種後21日目までにおいて、重大な副反応は認めなかったと報告されています。

18歳以上の接種後21日目までに現れた症状

報告割合	ファイザー社・モデルナ社
50%以上	疼痛 78.8%
10-50%	倦怠感 33.2% 筋肉痛 24.5% 頭痛 21.5% 硬結・腫脹 12.0%
1-10%	関節痛 8.4% 37.5度以上の発熱 6.6% リンパ節腫脹 4.7% 紅斑・発赤 8.0% 知覚障害 1.5% アレルギー反応 1.0%